


## Bijwerkingen systemische behandeling melanoom



Bovenstaande staafdiagram is gemaakt met behulp van data van de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR). De DMTR is de nationale melanoomregistratie in Nederland waarin alle stadium III en stadium IV patiënten worden geregistreerd die worden behandeld in de 14 melanoomcentra van Nederland. Medicijnbehandeling voor stadium III en IV melanoom kan alleen in die 14 ziekenhuizen gegeven worden.

Bij stadium III zijn er uitzaaiingen naar de lymfeklieren, of zijn er uitzaaiingen op de huid rondom de oorspronkelijke tumor, of zijn er uitzaaiingen in of onder de huid tussen de oorspronkelijke tumor en de nabijgelegen lymfeklieren. Bij stadium IV is de tumor uitgezaaid voorbij de nabijgelegen lymfeklieren naar een deel of delen van de huid of naar andere lymfeklieren, of naar andere organen zoals de lever, longen of de hersenen. Deze staafdiagram betreft het aantal patiënten met een irresectabel stadium melanoom. Dit zijn stadium III en IV patiënten waarbij niet alle uitzaaiingen/ziektelocaties met een operatie verwijderd kunnen worden. In de grafiek is het percentage patiënten te zien dat een graad 3 of hogere bijwerking heeft ervaren ten gevolge van hun behandeling. Elk middel heeft zijn eigen kleur en tussen haakjes staat het aantal mensen dat in de berekening is meegenomen per middel. Bijwerkingen worden ingedeeld in 5 graderingen:

- Graad 1 Mild; geen of zeer milde symptomen
- Graad 2 Matig; enige invloed op ADL (algemeen dagelijks leven), milde interventie

- Graad 3 Ernstig; ADL beperkt, soms opname nodig
- Graad 4 Levensbedreigend; interventie nodig
- Graad 5 Overlijden

In de grafiek zijn alleen patiënten meegenomen die een bijwerking vanaf graad 3 hebben ervaren.